

เตือนภัย..ไร้มันสำปะหลัง ระวัง “โรคพุ่มแจ้”

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา โดยมีเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยักเป็นพาหะ



อาการ เชื้อจะเข้าไปอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในท่อลำเลียงอาหารของต้นมันสำปะหลัง ทำให้ท่ออาหารอุดตันกลายเป็นสีน้ำตาลและดำไม่สามารถส่งอาหารไปยังใบได้ ทำให้ยอด ใบแห้งเหี่ยวหงิก และแตกตาใบเล็กๆ ออกมาเป็นพุ่มตามลำต้น ส่งผลให้ผลิตมันสำปะหลังลดลง

การจัดการ

๑. ใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลอดโรค สังเกตได้จากการแตกตา ด้านข้างของท่อนพันธุ์ โดยปกติท่อนพันธุ์จะแตกตาเฉพาะที่ส่วนยอดข้างบนเพียง ๒-๓ ตา เท่านั้น ถ้ามีการแตกตามาก แตกตาถี่บริเวณกลางท่อนพันธุ์ให้สงสัยไว้ก่อนว่าติดเชื้อ ห้ามนำมาปลูกเด็ดขาด

๒. การเตรียมดิน ควรกำจัด “ต้นสาบม่วง” ให้หมด โดยใช้วิธีทาง ไถกลบ หรือใช้สารเคมีกำจัด เพราะต้นสาบม่วงเป็นที่อยู่อาศัยของเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก

๓. เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลง หากพบการแตกกิ่งของท่อนพันธุ์ที่มีข้อสันนิษฐานติดพาหะให้ถอนออก แล้วนำไปเผาทิ้งหรือฝังกลบทำลายโดยหักใต้ออแตกตาลงมา ๓๐ ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อลามไปถึงหัวมันสำปะหลัง



“ต้นสาบม่วง”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙

กลุ่มอารักขาพืช

นางสาวรัฐยา กลั่นจ้อย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทร. ๐๓๕ - ๕๕๕๒๖๖ ต่อ ๒๒ มือถือ ๐๙๒ - ๒๘๔๘๖๖๕